

Angående äggallergi och influensavaccination.

Fråga: Vilka bör remitteras från primärvården till allergispecialist?

Svar: De som på grund av bekräftad eller misstänkt äggallergi har en helt (100%) äggfri kost. Remiss skickas då för bedömning.

Fråga: Hur handläggs detta på allergispecialistmottagningen?

Svar:

Vid anamnes på anafylaxi och på grund av denna helt äggfri kost gör vi en individuell bedömning och tar ställning till om vi ska avstå från vaccination.

Vid anamnes på andra allergiska reaktioner såsom urtikaria, kräkningar, angioödem, larynxödem, astma eller rinit utförs pricktest med vaccinet.

Vid negativ pricktest med vaccinet vaccineras patienten – bedömning görs individuellt om vaccinationen ska göras fraktionerat eller ej.

Vid positiv pricktest med vaccinet (≥ 3 mm diameter) utförs inte vaccination.

Således krävs en kombination av

Äggallergi (anamnesen viktigast, positiv pricktest/RAST för ägg stärker diagnosen) och 100% äggfri kost på grund av allergin för att motivera remiss till allergispecialist. De som har en lindrig form av äggallergi eller endast har misstänkt allergi och som kan äta sådant som innehåller ägg, även i små mängder, ex. sockerkaka, penslad bulle och liknande kan vaccineras på vårdcentral.

Stockholm den 31 augusti 2009

Gunilla Hedlin
Spesak Barn- och
ungdomsallergologi

Carl Eriksson
Spesak vuxenallergologi

Anders Lindfors
överläkare
Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Reidar Grønneberg
Överläkare
Karolinska Universitetssjukhuset

Per Thunqvist
Överläkare
Sachsska Barnsjukhuset

Lars Gottberg
Överläkare
Södersjukhuset

Anne Kihlström
Överläkare
Astrid Lindgrens barnsjukhus

Pär Gyllfors
Specialistläkare
Astma/allergimott St Görans sjukhus